



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Диакокса сельскохозяйственным птицам с лечебно-
профилактической целью при кокцидиозе

(организация-разработчик ООО «АТ Биофарм», Украина)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование: Диакокс (Diasox).

Международное непатентованное наименование: диклазурил.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Диакокс в качестве действующего вещества содержит в 100 г диклазурил - 0,2 г, в качестве вспомогательного вещества пшеничную крупу грубого помола до 100 г. По внешнему виду Диакокс представляет собой порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

3. Диакокс выпускают расфасованным по 25 кг в многослойных бумажных мешках, каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

4. Диакокс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства. Срок хранения Диакокса в смеси с кормом не должен превышать 6 месяцев, но не более 1 года с даты производства препарата. Диакокс запрещается применять по истечении срока годности.

5. Диакокс хранят в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Диакокс относится к кокцидиостатикам.

Диклазурил, входящий в состав лекарственного препарата, является производным бензенацетонитрила, обладает широким спектром кокцидицидного действия, эффективен в отношении всех внутриклеточных стадий цикла развития кокцидий, паразитирующих у

сельскохозяйственных птиц, включая *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetty*.

При пероральном введении Диакокс плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой оболочках. Выводится из организма птиц, с пометом, главным образом в неизменном виде в течение 3-4 дней.

Диакокс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Диакокс применяется с лечебно-профилактической целью цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур при кокцидиозе. В «челночных» программах использования антикокцидийных препаратов, Диакокс применяют после ионофорного или другого химического антикокцидийного препарата.

9. Запрещается применение Диакокса курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, в связи с его накоплением в яйцах.

10. Диакокс применяют в смеси с кормом в дозе 500 г на 1 тонну корма:

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания и исключают из рациона за 5 дней до убоя;

- ремонтному молодняку кур с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для равномерного распределения лекарственного препарата, суточную дозу Диакокса смешивают с небольшим количеством комбикорма (1:9), а затем при тщательном перемешивании вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. При применении Диакокса в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Отрицательного взаимодействия Диакокса с другими лекарственными препаратами не выявлено.

16. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Диакокса. Мясо птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Диакоксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Диакоксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Упаковку из-под лекарственного препарата утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: ООО «АТ Биофарм»; Украина, 61057, г. Харьков, пер. Театральный, 5-1а.

Инструкция разработана ООО «АТ Биофарм» (Украина) совместно с ООО «Витавет» (г. Москва).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Диакокса, утвержденная Россельхознадзором 22.06.2010 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационное удостоверение выдано ООО «АТ Биофарм», Украина.

Номер регистрационного удостоверения: *804-3-5.0-0474/№ ПБМ-3-5.0/03465*