



ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ЭМПРОБИО® для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, повышения резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц

(организация-производитель: ООО «Компания «ГринКо», Симферополь)

I. Общие сведения

1. ЭМПРОБИО® - кормовая добавка для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, повышения резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц.

2. ЭМПРОБИО® – состоит из живых не спорообразующих культур микроорганизмов *Lactobacillus casei*, *Lactococcus lactis*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Saccharomyces cerevisiae* и продукты их метаболизма. Количество живых микробных клеток в 1 мл кормовой добавки не менее – 10^6 - 10^8 КОЕ. Не содержит генетически модифицированных микроорганизмов.

3. ЭМПРОБИО® - прозрачная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета, с силостно - кефирным запахом, полностью растворимая в воде.

4. Кормовую добавку ЭМПРОБИО® выпускают расфасованной в полимерные флаконы по 0,01 мл, 0,033 мл, 0,1 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: названия организации производителя, ее адреса и товарного знака, наименования кормовой добавки, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, надписи «Для животных», номера партии, даты изготовления, массы (объема) нетто, объема продукта в единице фасовки, срока годности, условий хранения, манипуляционных знаков – «Беречь от нагрева», информации о подтверждении соответствия, обозначения технических условий и регистрационного номера и снабжают инструкцией по применению.

Хранить в чистом, сухом, темном, защищенном от атмосферных осадков месте, при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

Кормовая добавка не должна применяться по истечению срока годности.

II. Биологические свойства

5. Метаболиты микроорганизмов и флавоноиды растительного происхождения кормовой добавки ЭМПРОБИО® подавляют развитие патогенных бактерий и нормализуют кишечную микрофлору. У патогенных микроорганизмов не вырабатывается устойчивости к метаболитам кормовой добавки. Микроорганизмы кормовой добавки не образуют спор, поэтому после попадания в кишечник, им не требуется времени для активизации физиологических процессов.

6. Кормовая добавка ЭМПРОБИО® снижает риск диареи и дисбактериоза, останавливает диффузные поносы в краткие сроки. Применение Эмпроббио® увеличивает среднесуточный прирост и средний вес, повышает устойчивость организма к инфекциям, устойчивость к стрессам, снижает выбраковку птиц и животных, повышает сохранность поголовья

III. Порядок применения

7. Показания к применению:

- антибиотикотерапия,
- дисбактериоз,
- диарея, в том числе диффузная,
- воздействие стрессовых факторов (повышенная температура воздуха, переход на другие рационы кормов, скученное содержание и др.),
- низкая конверсия корма,
- медленный набор мышечной массы,
- высокий фон инфекционных и санитарно-значимых микроорганизмов.

8. Применять кормовую добавку ЭМПРОБИО® возможно в смеси кормом, питьевой нехлорированной водой или в чистом виде. Продолжительность профилактического курса 12-14 дней. При использовании ЭМПРОБИО® в составе комплексной терапии, доза увеличивается двукратно, продолжительность увеличивается на 3-7 дней (после выздоровления). При переходе на другой тип питания, перевозках, переформировании животных показано использование ЭМПРОБИО® для адаптации пищеварения и компенсации стресса.

Для профилактики заболеваний ЖКТ телят: Новорожденным телятам за 30 мин. перед первой выпойкой молозива 20 мл препарата добавить в 100 мл кипяченой воды (однократно). Суточная доза рассчитывается из количества вскармливаемого молозива, при каждом вскармливании молозива нужно давать 20 мл препарата. Выпаивать препарат до окончания молозиво-молочного периода (14д). Молодняку в возрасте до 3 мес. в конце молозиво-молочного периода давать по следующей схеме: 20-30 мл на голову/сутки. Молодняку в возрасте от 3 мес. до 6 мес. – 30-50 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ поросят: Новорожденным пороссятам на искусственном вскармливании суточная доза рассчитывается по количеству кормлений – 0,5 мл препарата на каждое вскармливания (14д). Поросятам в возрасте 14-28 дней – по 1-1,5 мл на голову/сутки. Поросятам на отъеме в возрасте 28-60 дней суточная доза составляет 1,5-2,0 мл на голову/сутки. Поросятам на доращивании в возрасте 60-90 дней суточная доза составляет 1,5-2,5 мл на голову/сутки. Свиньям на откорме возрастом более 90 дней суточная доза составляет 1,5-2,5 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ ягнят и козлят: Ягнята и козлята на искусственном вскармливании в возрасте с 1 по 10 день - 1-2 мл на голову/сутки на каждое вскармливание с молоком, суточная доза рассчитывается по количеству кормлений. Ягнята и козлята в возрасте 10-14 дней – 2-3 мл на голову/сутки. В возрасте 14 - 30 дней – 3-5 мл на голову/сутки. В возрасте от 1 мес. до 4 мес. по 5 - 10 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ лошадей: Новорожденным жеребят на искусственном вскармливании – 105 мл разделить на количество вскармливаемого молозива, выпаивать препарат до окончания молозиво-молочного периода (14д). Жеребята на отъеме возрастом до 1,5 года – 150 мл на голову/сутки. Для кобыл с жеребятами – 200 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ сельскохозяйственной птицы: молодняку возрастом до 20 дней - 1,0 л /1тонну воды, ремонтному молодняку и взрослой птице - 0,5 л /1тонну воды в течение 14 дней.

Для профилактики заболеваний ЖКТ гусей: Взрослым – 1-2 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,5-1 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ уток: Взрослым – 1-2 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,5-1 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ перепелов: Взрослым перепелам – 0,1 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,01-0,05 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ попугаев, канареек: Мелким (до 50 г) – 0,3 мл на голову/сутки. Средним(50-90 г) – 0,5 мл на голову/сутки. Крупным(свыше 90 г) – 0,8 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ голубей: Взрослым птицам – 0,3 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,5 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ собак: Комнатно-декоративных пород – 1-3 мл на голову/сутки. Мелких пород (до 10кг) – 3-5 мл на голову/сутки. Средних пород (10-30кг) – 9-12 мл на голову/сутки. Крупных пород (свыше 30кг) – 15 - 20 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ кошек: Мелких пород (до 4кг) – 1-2 мл на голову/сутки. Средних пород (4-6кг) – 2-3 мл на голову/сутки. Крупных пород (свыше 6кг) – 3-5 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ кроликов: Взрослым – 3-4 мл на голову/сутки. Молодняку – 1-1,5 мл на голову/сутки. Сукрольным и лактирующим крольчихам – 6-8 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ шиншилл: Взрослым – 0,2 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,1 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ декоративных грызунов: Мышам – 0,1 мл на голову/сутки. Крысам – 0,2 мл на голову/сутки. Морским свинкам – 0,5 мл на голову/сутки. Хомякам – 0,1 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ черепахам: Взрослым – 0,1 мл на голову/сутки. Молодняку – 0,5 мл на голову/сутки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ аквариумным рыбкам: Аквариум объемом 50 л - 25 мл 1 раз в 3 недели.

9. Применение кормовой добавки ЭМПРОБИО® не вызывает побочных реакций, не приводит к передозировке. Особых указаний при беременности, лактации, яйценоскости нет.

10. Кормовая добавка ЭМПРОБИО® совместима со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками, лекарственными средствами. Воду применять необходимо только нехлорированную.

11. Противопоказания для применения ЭМПРОБИО®: противопоказания не выявлены.

12. Продукты животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки ЭМПРОБИО® можно использовать в пищевых целях без ограничений

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с кормовой добавкой ЭМПРОБИО® следует соблюдать общепринятые личные правила гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. При попадании кормовой добавки ЭМПРОБИО® на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством водопроводной воды.

Инструкция разработана ООО «Компания «ГринКо» (Россия, РК, г. Симферополь, ул. Лизы Чайной, д.1, оф. 421.)