

2018

Более подробная информация по дозировке и применению приведена в листке-вкладыше к препарату

Название

лекарственная форма
действующие вещества (% или в 1г/1мл препарата)

ПОКАЗАНИЯ

ДОЗА

ПРИМЕНЕНИЕ

Антибактериальные препараты

ТимТил-250®

оральный раствор

тиамулина фумарат - 14,5%
тилозина тартрат - 10,5%



заболевания ЖКТ и органов дыхания (бронхит, микоплазмоз, эшерихиоз, пастереллез и т. п.)

1 мл
на 1 литр воды

С водой,
курс 3-5 дней

заболевания ЖКТ и органов дыхания (рожа, дизентерия, илеит, лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и т. п.)

0,8 мл на 10 кг
массы тела

С водой,
курс 3-5 дней

ТимТил

раствор для инъекций

тиамулина
гидроген фумарат - 8,75%
тилозина тартрат - 6,25%



бронхопневмония, дизентерия, перитонит, метрит, пупочный сепсис, гнойный артрит, копытная гниль, бруцеллез, лептоспироз, послеродовые осложнения, послеоперационные инфекции

Всем видам животных внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела, один раз в сутки в течение 3-5 суток

Спектра Флор - 10

оральный раствор

в 1 мл флорфеникол 100 мг



болезни бактериальной этиологии


300 мл препарата
на 100 л воды

С водой в течение 3-х дней

Спектра Кол

порошок для орального применения

в 1 г колистина сульфат 6 000 000 ME



болезни бактериальной этиологии

0,5 г на 10 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

1,0 г на 100 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

Спектра Тил

оральный раствор

тилмикозина фосфат 250 мг/мл



болезни бактериальной этиологии

30 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 3 дня


80 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 5 дней

Бровафом новый

порошок

колистина сульфат 25,0 мг (500000 ME)
окситетрациклин 35,0 мг
триметоприм 90,0 мг



микоплазмоз, коллибактериоз, пастереллез, заболевания органов дыхания, дизентерия, сальмонеллез

1 г на литр или
1,5-2 кг / 1т корма

С питьевой водой или кормом в течение 3-5 дней

энтериты, заболевания органов дыхания

0,5 г на 10 кг
массы тела

Перорально, 2 раза в день,
курс 5-7 дней

энтериты, заболевания органов дыхания

1-1,5 г
на литр

С питьевой водой в течение 3-5 дней

Цефтиокур 4 г

порошок ворастворимый для инъекций

цефтиофура натриевая соль - 100%



предупреждение ранней смертности (однодневные индюшата и цыплята)

0,08-0,2 мг
на голову
0,2-0,5 мг
на голову

Подкожно, однократно

Цефтиоклин

суспензия для инъекций

цефтиофура гидрохлорид - 5%



послеродовой эндометрит,
некробактериоз,
заболевания органов дыхания

1 мл на 16 кг
массы тела

Внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-4 дня



1 мл на 50 кг
массы тела

Подкожно или внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-5 дней

Трифлон

оральный раствор

энрофлоксацин 10%,
триметоприм 5%



бактериальные
и микоплазменные
инфекции

0,5-1,0 мл
на 1 л воды

С водой,
курс 3-5 дней

Энрабион

порошок

в 1 кг
энрамицина гидрохлорид 80 г



профилактика и лечение при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, в т.ч. при
некротическом энтерите, вызванных
микроорганизмами, чувствительными
к энрамицину. Стимуляция роста и развития
животных, снижение затрат корма,
повышение привесов

150 - 200 грамм
на тонну корма



150 - 300 грамм
на тонну корма

Кокцидиостатики

Мадуро Форте

нерастворимый в воде порошок

мадурамицин аммония - 9 мг;
диклазурил - 2 мг;



профилактика и
лечение эймериозов
(кокцидиозов)

0,5 г препарата
на 1 кг корма
(500 г на 1 т)

Тщательно перемешивают
сначала с небольшой частью
корма (3-10% общего
количества), а затем с осталь-
ным кормом.



Салимикс Плюс

нерастворимый в воде порошок

салиномицин натрия - 110 мг;
диклазурил - 2 мг;



профилактика и
лечение эймериозов
(кокцидиозов)

500 г препарата
на 1 т корма
250-500 г/1 т в
возрасте до 4 мес.,
250 г/1 т до 6 мес.

Тщательно перемешивают
сначала с небольшой частью
корма (3-10% общего
количества), а затем с осталь-
ным кормом.



84-250 г препарата
на 1 т корма

Диакокк

нерастворимый в воде порошок

диклазурил - 2 мг



профилактика и
лечение эймериозов
(кокцидиозов)

500 г препарата
на 1 т корма

Тщательно перемешивают
сначала с небольшой частью
корма (3-10% общего
количества), а затем с осталь-
ным кормом.



0,5 г на 1 кг
массы тела



Соликокк

оральный раствор

диклазурил - 2,5 мг



лечение эймериозов
(кокцидиозов)

2 мл на 1 л
питьевой воды

Курс 2 дня



Спектра Кокк

оральный раствор

в 1 мл содержит толтразурил 25 мг



профилактика и лечение
эймериозов (кокцидиозов) у
цыплят-бройлеров и ремонтного
молодняка кур, уток, гусей, индеек

1 мл на 1 л
питьевой воды

В течение 48 часов



Противовоспалительные препараты

Кефен

раствор для инъекций

кетопрофен - 10%



острое или хроническое течение
воспалительных процессов

0,3 мл препарата
на 10 кг массы тела

В/м и в/в 1 раз в сутки
в течение 1-3 суток



1 мл препарата
на 45 кг массы тела

В/м 1 раз в сутки
в течение 3-5 суток

Пробиотики и пребиотики

Эмпробио

оральный раствор

состоит из живых не спорообразующих культур микроорганизмов
 Lactobacillus casei,
 Lactococcus lactis,
 Lactobacillus plantarum,
 Lactobacillus acidophilus,
 Saccharomyces cerevisiae
 и продуктов их метаболизма



профилактика и лечение желудочно-кишечных заболеваний, стабилизации микрофлоры кишечника, улучшения процесса пищеварения

Молодняку кур и индеек возрастом до 20 дней – 1,0 л /тонну воды, ремонтному молодняку и взрослой птице – 0,5 л /тонну воды в течение 14 дней.

Молодняку КРС в возрасте до 3 мес. 20-30 мл на голову/сутки, в возрасте от 3 -6 мес. – 30-50 мл на голову/сутки.

Новорожденным пороссятам - 0,5 мл на каждое вскармливание в течение 14 дней.
 Пороссятам 14-28 дней – по 1-1,5 мл на голову/сутки.
 Пороссятам на отъеме в возрасте 28-60 дней 1,5-2,0 мл на голову/сутки.
 Пороссятам 60-90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.
 Свињям более 90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.

Маннацель+

порошок

МОС-40%;
 экстракт дрожжевой культуры
 Saccharomyces cerevisiae - 40%



добавка для повышения сохранности и продуктивности

Вводят в премиксы, комбикорма для поросят 2,0 кг/т корма, свиней на откорме 1,0 кг/т корма, для телят 5,0 г/гол/день, для молочных коров 20,0 г/гол/день; для бройлеров 1,5 кг/т корма, для несушек, родителей и индюков 1,0 кг/т корма.

Иммуномодуляторы

Авесстим

раствор

производное триазола - 2%



улучшение устойчивости птицы к инфекционным возбудителям, усиление резистентности организма, активизация специфического иммунного ответа на вакцинацию

1 мл на 3 л воды с водой, курс 4-5 дней

1-2 мл аэрозольно на 1 м³ экспозиция 40 мин, курс 3-5 дней

Антигельминтные средства

Бровермектин 2%

раствор

ивермектин - 2%



гельминтозы животных и птиц

1 мл на 50 кг массы тела

с 1/3 суточной нормы воды, при акарозах повторить через 7-10 дней

Препараты для лечения репродуктивных органов

Гистерлик

таблетки (7,5 г)

сульфадиазина натриевая соль - 53%
 канамицина сульфат - 0,67%
 окситетрациклина гидрохлорид - 0,67%



острый эндометрит, метрит, цервицит, вульвовагинит, вызванные Грам (+), Грам (-), аэробными и анаэробными бактериями, санация матки после выделения последа

7,5-15 г на 1 животное

внутриматочно, курс 2-3 дня (до закрытия шейки матки)

Брозтрофан

раствор для инъекций

клопростенола натриевая соль - 0,025%



усиление потуг при осложненных родах, ускорение инволюции матки, задержание последа, терапия метритов в комбинации с противомикробными средствами, регрессия персистентного желтого тела и кисты желтого тела, стимуляция и синхронизация эструса в период осеменения

2 мл на 400 кг (на каждые + 50 кг добавить 0,3 мл)

внутримышечно, однократно

Противомаститные препараты

Бровамаст 2Д

суспензия



клоксациллина натриевая соль - 3%
неомицина сульфат - 1,5%
сульфатаiazол натрия - 5%

серозный, катаральный,
фибринозный, гнойный,
субклинический мастит
(дойные коровы)

10 мл в каждую
долю вымени

Интрацестернально,
курс 2-3 дня

Тримаст форте

суспензия



В 10 мл содержит 200 мг энрофлоксацина,
100 мг триметоприма и 10 мг преднизалона

серозный, катаральный,
фибринозный, гнойный,
субклинический мастит
(дойные коровы)

10 мл в каждую
долю вымени

Интрацестернально,
курс 1-4 дня

Нейтрализаторы микотоксинов

Кормо-токс Плюс

порошок



алюмосиликат натрия - 85%;
каолинит - 7%;
экстракт дрожжевой культуры
Saccharomyces cerevisiae - 8%.

добавка для адсорбции
афлатоксина В₁,
охратоксина А,
зеараленона, Т-2 токсина
в кормах

1-2 кг/ 1 т корма

Витаминные комплексы и гепатопротекторы

Карнивит

раствор



В 1 л препарата содержится:
Магний (Mg) 1800-2200 мг/л;
Витамин В12 27-33 мг/л;
L-карнитин 27000-33000 мг/л;
DL-метионин гидроксид аналог
13500-16500 мг/л;
Натрия гидроксид 4500-5500 мг/л;
Витамин В3 (никотинамид)
13500-16500 мг/л;
Бетаин 27000-33000 мг/л;
Витамин В6 4500-5500 мг/л;
Холин хлорид 108-132 г/л.

Для повышения сохранности
и увеличения продуктивности
сельскохозяйственных животных,
в том числе птиц.

0,25 мл на 1 л воды

Курс 3-5 дней



2 мл на 10 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней



10 мл на 100 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней

Брио Эггшелл

порошок



В 1 кг препарата содержится:
Витамина В2 1000 мг; Витамина В5 1000 мг;
Витамина В6 2000 мг; Витамина В12 10 мг;
Витамина РР 5000 мг; марганца 10000 мг;
бутират кальция 15%; карбонат кальция 85% до 1 кг.

для увеличения продуктивности
кур-несушек и повышения
прочности скорлупы яиц

0,2% от массы корма

Оптивит В +

порошок



В 1 кг содержит не менее:
витамина В1 8800 мг; витамина В2 5500 мг;
витамина В6 5800 мг; витамина В12 11000 мкг;
витамина С 22000 мг; витамина К3 - 3000 мг;
никотиновой кислоты - 18000 мг;
пантотеновой кислоты - 20000 мг;
фолиевой кислоты - 300000 мкг;
биотина - 100000 мкг

кормовая добавка для
балансирования и обогащения
витаминами рационов птицы

1-2 г на 1 кг корма
в сутки
или
0,5-1 г на 1 л воды
в сутки

Курс 3-7 дней